

ILEUM KONDUIT

Funktion | Fragen | Antworten

Vorbereitung auf die Operation


Ein Teil Ihres Darms wird für die Harnableitung verwendet. Ihr Arzt wird Ihnen spezifische Anweisungen zur Darmvorbereitung auf die Zystektomie geben. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt nach speziellen Präparaten, die Sie vor der Operation einnehmen sollten. Außerdem zu erfragen:

- Medikamente oder pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, die Sie meiden oder nicht mehr einnehmen sollten
- Einschränkungen bei Essen und Trinken

Sprechen Sie mit einer Stoma-Schwester. Diese kann bei der Entscheidung helfen, wo Sie das Stoma haben möchten. Bedenken Sie dabei Ihre Kleidungsstücke, die Sie Zuhause haben.

Die Stoma-Schwester schult Sie darauf, wie Sie den Beutel wechseln und die Haut um ihn herum sauber halten können.

Die Stoma-Schwester kann Sie auch dahingehend beraten, welche Stomaversorgungen Sie zusätzlich ausprobieren können.



Was ist ein Ileum Konduit?

Ein Ileum-Konduit (IC) ist die häufigste Harnableitung, die von Urologen durchgeführt wird. Es handelt sich dabei um eine einfache Form der Rekonstruktion der Harnwege, bei der das Ileum als alternativer Weg für den Austritt des Urins aus dem Körper genutzt wird. Das IC speichert keinen Urin.

Es ist eine Möglichkeit, um den Urin aus dem Körper zu entfernen.

Wie wird ein Ileum Konduit gebaut?

Nach einer radikalen Zystektomie (Blasenentfernung) wird eine Harnableitung gebaut, um Urin aus dem Körper abfließen zu lassen. Das macht der Arzt:


1. Ein Ende eines kurzen Dünndarmsegments wird zur Haut angebracht. Da ein Stoma keine Nervenendigungen besitzt, ist es auch nicht schmerzhaft.
2. Die Harnleiter, die normalerweise den Urin von der Niere zur Blase befördern, werden am anderen Ende des

Nächste Schritte

- Sie benötigen gelegentlich Bluttests, um die Körpersalze und Nierenfunktion zu überprüfen.
- Sie werden gelegentlich eine Bildgebung vom Bauchraum benötigen, um zu bestätigen, dass der Krebs nicht zurückgekehrt ist.
- Sie werden nach wie vor zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen für Blasenkrebs gehen, um sicher zu stellen, dass sich der Krebs nicht ausgeweitet hat.
- Möglicherweise empfiehlt Ihnen der behandelnde Arzt eine Chemotherapie, um die Ausbreitung des Tumors zu verhindern.

Darmsegmentes befestigt. Der Urin wandert von den Harnleitern in die neu gebildete Harnableitung, durch das Stoma und aus dem Körper heraus.

3. Ein Stomabeutel wird über das Stoma gelegt. Dieses Gerät besteht aus einer haftenden Hautbarriere (Wafer), die auf der Haut um das Stoma herum angeklebt wird, und aus einem Beutel. Der Beutel sammelt den Urin und wird außerhalb des Körpers getragen. Am Boden des Beutels befindet sich ein Drehventil, mit dem der Urin bequem abgelassen werden kann.



Nach der Ileum Konduit Operation

Die neue Harnableitung nimmt die geringste Zeit bei der Operation in Anspruch und verbraucht die geringste Menge an Dünndarm. Viele Patienten haben eine schnellere Genesung als bei anderen Harnableitungsoperationen. Mit Bedacht können Sie viele Probleme vermeiden.

- Eine Operation kann zu einer Schwellung führen, so dass die Größe Ihres Stomas schrumpft, wenn Sie sich nach der Operation wieder erholen.
- Wenn Sie sich wieder erholt haben, vergewissern Sie sich, dass Ihre Stomaversorgungen noch richtig passen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kleidung bequem ist. Nach der Heilung können die meisten Menschen die gleiche Kleidung wie vor der Operation tragen.

Undichte Stellen treten manchmal auf. Bereiten Sie daher

zusätzliches Verbrauchsmaterial und Kleidung im Auto, bei der Arbeit oder im Rucksack vor.

- Sobald das Stomagebiet verheilt ist und Sie dennoch eine Wölbung bemerken, die unangenehm ist oder die Befestigung Ihres Stomagerätes erschwert, wenden Sie sich an Ihren Urologen.
- Sprechen Sie mit Ihrer Stomaschwester, wenn Sie Probleme mit Leckagen oder Beschädigungen an Ihrem Beutel bemerken. Die Aufrechterhaltung der Harnableitung wird zur Routine in Ihrem Alltag werden.
- Es kann zu einer Harnwegsinfektion kommen. Achten Sie auf stärker riechenden, trüben, dunklen oder blutigen Urin beim Beutelentleeren. Ein Harnwegsinfekt könnte auch Schmerzen im unteren Rückenbereich hervorrufen. Wenden Sie sich daher an Ihren Urologen, wenn Sie den Verdacht auf einen Harnwegsinfekt haben.