


# TURBT

## Funktion | Fragen | Antworten

### Fragen an Ihr Gesundheitsteam

- Was sagen die Ergebnisse der TURBT aus?
- Wie lange dauert die TURBT?
- Werde ich während der TURBT auch andere Behandlungen bekommen?
- Wie lange wird es dauern, bis ich mich nach der TURBT erholt habe?
- Wann werden Sie die Pathologiebefunde haben? Wie erfahre ich davon?
- Wie oft haben Sie eine TURBT gemacht? Welche Erfahrung haben Sie damit?



## Was bedeutet TURBT?

Die transurethrale Resektion des Blasentumors ist ein chirurgisches Verfahren zur Diagnose und Behandlung von sichtbaren Blasentumoren. Die TURBT wird im Krankenhaus durchgeführt.

Die meisten Patienten gehen normalerweise 1-3 Tagen nach Hause. Bei anderen wird aufgrund ihrer Beschwerden oder des Umfangs der Tumorresektion ein 5-7-tägiger Aufenthalt im Krankenhaus nötig.

## Wie wird die TURBT durchgeführt?

Ein Resektoskop wird durch die Harnröhre eingeführt, um die Blase in Narkose (Vollnarkose oder Kreuzstich) optimal zu untersuchen. Der Arzt verwendet eine kleine elektrische Schleife aus Draht, die am Zielfernrohr befestigt ist, um Blasentumore und nahegelegenes Gewebe zu entfernen.

Ein Pathologe untersucht in Folge das entnommene Gewebe, um das Stadium und den Grad des Blasenkrebses zu bestimmen zu können. Sie können direkt nach einer TURBT ein


## Vor dem Eingriff

- Bringen Sie einen Freund oder ein Familienmitglied mit, um Notizen darüber zu machen, was mit Ihrem Arzt besprochen wird.
- Fragen Sie Ihren Arzt, welche Art von Anästhesie-Optionen für Sie in Frage kommen. Finden Sie heraus, ob Sie im Speziellen etwas vor dem TURBT-Verfahren tun sollten.

## Während der TURBT

- Es werden die sichtbaren Tumore mit Instrumenten, die durch das Resektoskop eingeführt werden, von der Auskleidung Ihrer Blasenwand weggeschnitten.
- Sobald ein Tumor entfernt wurde, wird mittels eines milden Stroms die Blutung verhindert oder reduziert, indem die Region verödet wird.

Chemotherapeutikum in die Blase verabreicht bekommen. Diese Chemotherapie ist eine intravesikale Behandlung. Sie kann die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Tumorrezidive verringern. Mitomycin C ist ein häufiges Medikament, das zu diesem Zweck verwendet wird.



## Nach der TURBT

Sobald der Eingriff vorbei ist, werden Sie in den Aufwachraum gebracht. Sie werden gebeten, viel Wasser zu trinken. Trinkwasser hilft beim Ausspülen der Blase.

Wenn Sie aufwachen wird ein Katheter in Ihrer Blase zur Blasenentleerung gelegt sein. Es kann sein, dass Flüssigkeit zugegeben wird, um Blut und Schmutz aus der Blase zu entfernen.

Bei anhaltender Blutung kann es erforderlich sein, dass Sie über mehrere Tage einen Katheter bekommen. Wenn Sie mit dem Katheter nach Hause entlassen werden, stellen Sie sicher, dass Sie damit umgehen können, und auch wissen, wann er entfernt werden soll.

Zu den Nebenwirkungen der TURBT zählen schmerzhaftes Wasserlassen, Blasenreizung und Blasenkrampf. Medikamente und beruhigende Gels können helfen. Fragen Sie Ihren Arzt nach einer Empfehlung.

Blut im Urin und sich aus dem betroffenen Gebiet abgehende Blutgerinnsel können noch einige Wochen auftreten.

Einlagen oder Schutzunterwäsche sind hilfreich, wenn Sie nach der Behandlung ungewollt Urin verlieren.

Planen Sie eine Schonungsphase von ein paar Tagen nach der TURBT ein.

Kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt oder das Krankenhaus, wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht stimmen sollte.

Fordern Sie den Pathologiebefund an und bewahren Sie diesen zusammen mit Ihrer Krankengeschichte auf.